Fynsvej 8
9500 Hobro
Tlf. 98520044
E-mail: lvk@lvk.dk
www.lvk.dk

# Nyhedsbrev maj 2018

## *LVK Minkdyrlægerne*

LVK Nyhedsbrev

**Fødslerne lod vente på sig i år**

Langt de fleste af jer har oplevet en større andel sent fødte hvalpe i år. Det gælder også farme, som har brugt lys under implantationsperioden. Her halvvejs i maj bliver der fortsat født nye kuld på farmene.

Erfaringer fra tidligere år viser, at problemer med dårlige trivsel og diarreer ofte begynder i de sent fødte kuld. I år anbefales ekstra fokus på den relativ store gruppe af hvalpe, som er født sent dvs. efter den 3.-5. maj.

Pas på ikke at fodre tæverne, som har født sent, for kraftigt, hvilket ofte resulterer i fede tæver, som malker dårligt. De sent fødte hvalpe bør heller ikke fodres nede på redekasselåget før de er 4 uger gamle, da det øger risikoen for coli diarreer, da hvalpenes mavetarmkanal ikke er tilstrækkelig modent til at kunne omsætte foderet. Flere avlere samler de sent fødte kuld, i et hus der stod tomt inden, således at de nemmere kan have andre rutiner for de kuld mht. fodring, vanding, hvalpenet, sluser osv.

**Hvalpediarreer/ fedtede hvalpe**

Pinsen står for døren, og desværre er den på minkfarme ofte forbundet med travlhed pga. hvalpediarreer. På nogle farme er problemerne med hvalpediarreer allerede begyndt.

Vi ved at hvalpediarreer oftere er at problem hos 1. årstæver end ældre tæver. Årsagen er formentlig, at de ældre tæver giver en bedre beskyttelse videre til deres hvalpe mod de virus, som er indblandet i hvalpediarreerne nemlig Astro- og Calicivirus.

På langt de fleste farme findes de virus og bakterier, som kan give hvalpediarreer allerede i miljøet. Hvis man holder tæven og hvalpene robuste og gør betingelserne dårlige for smitstofferne, så kan hvalpe og tæves immunsystem holde infektionerne nede.




På den positive vægtskål vejer et tørt og lunt nærmiljø i redekassen og god hygiejne i buret tungt. I år, hvor maj indtil videre har været varm, bør der laves mere luft i redekasserne og fjernes sluser tidligere end år med en kold maj. Derudover er det fortsat vigtigt at have fokus på at få behandlet tæver med yverbetændelser tidligt i sygdomsforløbet. Gerne både med antibiotika og smertelindrende medicin. Ved diarre hos hvalpe er det hvalpene, som skal behandles med antibiotika.

Tal med dyrlægen om evt. bakterie dyrkning og resistensbestemmelse.

LVK Minkdyrlægerne

Minkdyrlæge
Teamleder
Peder Elbek
M: 21715301
Mail:pep@lvk.dk

Minkdyrlæge
Jan Kjeldsen
M: 40768002
Mail:jak@lvk.dk

Minkdyrlæge
Annette B. Bech
M: 21715287
Mail ab@lvk.dk

Minkdyrlæge
Marianne Rom
M: 21630512
Mail: mr@lvk.dk

Minkdyrlæge
Tage Rødbro
M: 30994624
Mail:tr@lvk.dk

Minkdyrlæge
Magnus Højris
M: 22717796
Mail:mah@lvk.dk

Minkdyrlæge
Karin Mundbjerg
M: 21715291
Mail:km@lvk.dk

Minkdyrlæge
Mette Gade
M: 21715286
Mail:mg@lvk.dk

Minkdyrlæge
Sanne Tygesen
M: 21715303
Mail:sts@lvk.dk

Fynsvej 8
9500 Hobro
Tlf. 98520044
E-mail: lvk@lvk.dk
www.lvk.dk



På den negative vægtskål vejer fugtige redekasser, beskidte hvalpenet og ubehandlede infektioner tungt, samt formentlig både en for svag eller for kraftig fodring.
Der er nu en SOP for "fedtede" hvalpe (hvalpediarreer) på LVK's kundeportal under avler-mink og rådgivningsværktøjer/vejledninger både i word og PDF-format.

**Fodring i maj**

Vi hører ofte fra jer, at en for kraftig fodring i maj giver hvalpediarreer og yverbetændelser hos tæverne. Dette har dog ikke kunne eftervises i forsøg. Derimod har Julie Melsted Birchs forsøg, fra 2015 på 30 farme, vist at en for restriktiv fodring i den sidste del af drægtighedsperioden øger risikoen for hvalpediarreer. Dyrlæge Børge Mundbjerg fra Biovet har også kigget en del på foderkurver fra farme med og uden problemer i maj. Børge Mundbjerg så en tendens til at problemfarme fodrer stærkt i marts og svagt i slutningen af april. Derudover så han, at fodring med et niveau væsentligt under fodercentralens gennemsnit i perioden efter fødsel er en risiko.

Vi fraråder, at lade frygten for hvalpediarreer, få jer til at fodre så restriktivt, at hvalpene bliver for små, og tæverne begynder at golde af for tidligt. På den anden side skal tæverne heller ikke øges for stærkt i foderstyrke, især ikke tæver, som har født sent eller har små kuld. Det handler således om at finde den gyldne middelvej. Her kan tommelfingerreglen om, at farmens gennemsnitlige foderforbrug bør stige med ca. 4 % om dagen frem til den 21/5 og herefter 3 % pr. dag, bruges. Se kurven nedenfor, som også kan findes på Farmcockpit.




***Med Venlig Hilsen***

LVK Minkdyrlægerne

Minkdyrlæge
Teamleder
Peder Elbek
M: 21715301
Mail:pep@lvk.dk

Minkdyrlæge
Jan Kjeldsen
M: 40768002
Mail:jak@lvk.dk

Minkdyrlæge
Annette B. Bech
M: 21715287
Mail ab@lvk.dk

Minkdyrlæge
Marianne Rom
M: 21630512
Mail: mr@lvk.dk

Minkdyrlæge
Tage Rødbro
M: 30994624
Mail:tr@lvk.dk

Minkdyrlæge
Magnus Højris
M: 22717796
Mail:mah@lvk.dk

Minkdyrlæge
Karin Mundbjerg
M: 21715291
Mail:km@lvk.dk

Minkdyrlæge
Mette Gade
M: 21715286
Mail:mg@lvk.dk

Minkdyrlæge
Sanne Tygesen
M: 21715303
Mail:sts@lvk.dk