

Kontrolkampagner

Fra februar til maj afholder Fødevarestyrelsen kontrol af dyrevelfærd i kvægbesætninger med udgangspunkt i DyreBaserede VelfærdsIndikatorer (DBVI)

De valgte DBVI for kvæg er:

- Huld, halthed, renhed, hudskader/trykninger

En trafiklys-model bruges til at vise, om besætningen ift. til hver enkelt DBVI, vurderes som acceptabel (grøn), i gråzone (gul) eller uacceptabel (rød). F.eks. vil besætningen blive markeret rød for huld, hvis dyrene er for magre.

I så fald vil der være tale om en overtrædelse af lovgivningen, som vil blive håndteret.

Der vil i kampagnen være fokus på en dialog med den besætningsansvarlige omkring dyrevelfærd i besætningen med udgangspunkt i DBVI-resultaterne.

Fra september til november afholder Fødevarestyrelsen kontrol af håndtering af syge og tilskadekomne dyr i malkekvæg- og slagtekalvebesætninger.

Vi har her prøvet at opsummere reglerne på området:

Der skal være mindst én sygeplads på bedriften pr. 100 køer (afrundes til nærmeste hele antal sygepladser). Disse sygepladser kan være i en fællessygeboks, enten med dybstrøelse eller sengebåse. Men der skal være et tørt og blødt underlag for dyret at ligge på.

Syge og tilskadekomne malkekøer skal opstaldes i enkeltsygebokse, hvis det er nødvendigt. Hvis der ikke er enkeltsygebokse på bedriften, har Fødevarestyrelsen udtalt, at de skal kunne etableres indenfor 15 min. Hvis flere syge køer har brug for at være i enkeltsygebokse, end der er enkeltsygebokse til rådighed, skal den dårligste ko aflives.

Som en hjælp til vurderingen af om det er nødvendigt, at en syg ko kommer i enkeltsygeboks, har SEGES lavet denne vejledning:

		Koens behov for isolation versus kontakt til andre køer	
		Enkeltboks	Fællesboks
Smittebeskyttelse	Smitsom	Meget syg Kan smitte andre Diarre, ledbetændelse, alvorlig yverbetændelse, lungebetændelse	Mild til moderat syg Hygiejne Børbetændelse, let yverbetændelse, slem digital dermatitis
	Ikke smitsom	Skal kunne være i fred Ikke smitsomme Løbesår, mælkefeber, højræsiddig løbedrejning	Aflastning Ikke smitsomme Ketose, sålesår, venstresiddig løbedrejning

Billede: SEGES

På bedrifter med malkekvæg skal enkeltsygebokse have et areal pr. ko på mindst 10 m² (små racer) eller 12m² (store racer). Fællessygebokse skal have et areal på mindst 6,8 m² (små racer) eller 8,0 m² (store racer).

Kælvningsbokse må kun bruges som sygebokse, hvis dyret bliver syg ifm. kælvning eller hvis dyret ikke lider af en smitsom sygdom. Der skal kunne maskinmalkes i syge- og kælvningsbokse (f.eks. med en mobilmalke-maskine). Der skal i stalde med ungdyr let kunne etableres en sygeplads i en sygeboks. Sygepladsen må gerne være i et andet staldafsnit end i selve stalden med ungdyr.

Halte køer kommer sig hurtigere i en sygeboks

Der er lavet en dansk undersøgelse, der viser, at det betaler sig at flytte halte køer i sygeboks. 60 % af de halte køer blev mindre halte eller normalt gående efter 3 uger i en sygeboks. Hvorimod kun 27 % af de halte køer blev mindre halte, når de gik i flokken af øvrige køer. 40 % af de svært halte køer var dog stadig meget halte efter 3 uger.

Mælkeprøvesvar

Det er nu muligt at finde alle besætningens mælkeprøvesvar samlet i mappen "Laboratoriesvar" på Landmandsweb.



Kvægdyrlægerne